

*2022年8月改訂(第4版)
2022年5月改訂(第3版)

貯法：室温保存
*有効期間：5mg：30ヵ月
12.5mg/25mg/75mg：36ヵ月

HIF-PH阻害薬/腎性貧血治療薬
モリデスタットナトリウム錠
劇薬、処方箋医薬品^{注)}

日本標準商品分類番号
873999

	承認番号	販売開始
錠5mg	30300AMX00020000	2021年4月
錠12.5mg	30300AMX00021000	2021年4月
錠25mg	30300AMX00022000	2021年4月
錠75mg	30300AMX00024000	2021年4月

マスーレッド[®]錠 5mg
マスーレッド[®]錠 12.5mg
マスーレッド[®]錠 25mg
マスーレッド[®]錠 75mg
MUSREDO tablets 5mg/12.5mg/25mg/75mg



注)注意—医師等の処方箋により使用すること

D4

1. 警告

本剤投与中に、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の重篤な血栓塞栓症があらわれ、死亡に至るおそれがある。本剤の投与開始前に、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の合併症及び既往歴の有無等を含めた血栓塞栓症のリスクを評価した上で、本剤の投与の可否を慎重に判断すること。また、本剤投与中は、患者の状態を十分に観察し、血栓塞栓症が疑われる徴候や症状の発現に注意すること。血栓塞栓症が疑われる症状があらわれた場合には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導すること。
[11.1.1 参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	マスーレッド錠 5mg	マスーレッド錠 12.5mg	マスーレッド錠 25mg	マスーレッド錠 75mg
有効成分	1錠中モリデスタット 5mg 含有(モリデスタットナトリウムとして 5.35mg)	1錠中モリデスタット 12.5mg 含有(モリデスタットナトリウムとして 13.375mg)	1錠中モリデスタット 25mg 含有(モリデスタットナトリウムとして 26.75mg)	1錠中モリデスタット 75mg 含有(モリデスタットナトリウムとして 80.25mg)
添加剤	結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク 乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール 6000 EP/NF、黄色三二酸化鉄	D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、フマル酸ステアリルナトリウム	D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、フマル酸ステアリルナトリウム、三二酸化鉄	D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、フマル酸ステアリルナトリウム

3.2 製剤の性状

販売名	マスーレッド錠 5mg	マスーレッド錠 12.5mg	マスーレッド錠 25mg	マスーレッド錠 75mg
剤形	フィルムコーティング錠			
色調	淡赤黄色	白色	灰黄赤色	白色
外形	表面	マスーレッド 5	マスーレッド 12.5	マスーレッド 25
	裏面			75
	側面			
大きさ	直径5mm	直径5.5mm	直径7mm	長径11mm 短径5mm
厚さ	2.9mm	2.4mm	3.1mm	4.5mm
質量	61.75mg	64.70mg	128.6mg	206.0mg

4. 効能又は効果

腎性貧血

5. 効能又は効果に関連する注意

赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合の本剤投与開始の目安は、保存期慢性腎臓病患者及び腹膜透析患者ではヘモグロビン濃度で11g/dL未満、血液透析患者ではヘモグロビン濃度で10g/dL未満とする。

6. 用法及び用量

〈保存期慢性腎臓病患者〉

赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合

通常、成人にはモリデスタットとして1回25mgを開始用量とし、1日1回食後に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回200mgとする。

赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合

通常、成人にはモリデスタットとして1回25mg又は50mgを開始用量とし、1日1回食後に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回200mgとする。

〈透析患者〉

通常、成人にはモリデスタットとして1回75mgを開始用量とし、1日1回食後に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回200mgとする。

7. 用法及び用量に関連する注意

7.1 保存期慢性腎臓病患者で、赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合の開始用量

下表を参考に、切替え前の赤血球造血刺激因子製剤投与量から本剤の投与量を決定し、切り替えること。

本剤 投与量 (mg)	ダルベポエチン アルファ(μg)		エポエチ ンベータ ペゴル (μg)	エポエチンアル ファ又はベータ (IU)	
	2週に1回	4週に1回	4週に1回	週に1回	2週に1回
25	15以下	30以下	25以下	1500以下	3000以下
50	15超	30超	25超	1500超	3000超

7.2 投与量調節

投与量調節が必要な場合には、下表を参考に1段階ずつ投与量を増減すること。

段階	1	2	3	4	5	6	7	8
本剤 投与量	5mg	12.5mg	25mg	50mg	75mg	100mg	150mg	200mg

赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合、本剤投与開始4週後は[4週時投与量増減表]を、それ以降は[投与量増減表]を参考に投与量を増減すること。

赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合、[投与量増減表]を参考に投与量を増減すること。なお、増量は原則として4週間以上の間隔をあけて行うこと。休薬した場合は、1段階低い用量で投与を再開すること。

[4週時投与量増減表(赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合)]

4週間のHb値 上昇	Hb値		用量調節
	保存期慢性腎 臓病患者及び 腹膜透析患者	血液透析患者	
0.5g/dL未満	10.5g/dL未満 10.5g/dL以上	9.5g/dL未満 9.5g/dL以上	1段階増量
0.5g/dL以上 1.0g/dL未満	すべての値		同じ用量を維持
1.0g/dL以上 2.0g/dL以下	11.0g/dL以下 11.0g/dL超	10.0g/dL以下 10.0g/dL超	
2.0g/dL超	すべての値		1段階減量

[投与量増減表]

用量調節		1段階増量	同じ用量 を維持 ^{注1)}	1段階減量	休薬 ^{注2)}
Hb値	保存期慢性腎臓病患者及び腹膜透析患者	11.0g/dL未満	11.0g/dL以上 12.5g/dL未満	12.5g/dL以上 13.0g/dL未満	13.0g/dL以上
	血液透析患者	10.0g/dL未満	10.0g/dL以上 12.0g/dL未満	12.0g/dL以上 13.0g/dL未満	

注1) 血栓塞栓症(心筋梗塞、肺血栓塞栓症、出血性脳卒中を除く脳卒中、及び急性下肢虚血)の既往のある患者では、Hb値が12g/dLを超えた場合、投与量を1段階減量してもよい。

注2) 休薬後の再開の目安は、Hb値が保存期慢性腎臓病患者及び腹膜透析患者で12.5g/dL未満、血液透析患者で12.0g/dL未満になった時点とする。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤投与開始後、ヘモグロビン濃度が目標範囲で安定するまでは、2週に1回程度ヘモグロビン濃度を確認すること。
- 8.2 本剤投与中はヘモグロビン濃度等を4週に1回程度確認し、必要以上の造血作用があらわれないように十分注意すること。赤血球造血刺激因子製剤の臨床試験において、ヘモグロビン濃度の目標値を高く設定した場合に、死亡、心血管系障害及び脳卒中の発現頻度が高くなったとの報告がある^{1),3)}。
- 8.3 ヘモグロビン濃度が、4週以内に2.0g/dLを超える等、急激に上昇した場合は速やかに減量又は休薬する等、適切な処置を行うこと。
- 8.4 赤血球造血刺激因子製剤から本剤への切替え後にヘモグロビン濃度が低下する傾向が認められていることから、切替え後のヘモグロビン濃度の低下に注意すること。
- 8.5 本剤投与により血圧が上昇するおそれがあるので、血圧の推移に十分注意しながら投与すること。
- 8.6 造血には鉄が必要なことから、必要に応じて鉄の補充を行うこと。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
 - 9.1.1 脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の患者、又はそれらの既往歴を有する患者
本剤投与により血栓塞栓症を増悪あるいは誘発するおそれがある。
 - 9.1.2 高血圧症を合併する患者
血圧上昇があらわれるおそれがある。
 - 9.1.3 悪性腫瘍を合併する患者
本剤の血管新生亢進作用により悪性腫瘍を増悪させるおそれがある。
 - 9.1.4 増殖糖尿病網膜症、黄斑浮腫、滲出性加齢黄斑変性症、網膜静脈閉塞症等を合併する患者
本剤の血管新生亢進作用により網膜出血があらわれるおそれがある。
- 9.3 肝機能障害患者
 - 9.3.1 中等度以上の肝機能障害(Child-Pugh分類B又はC)のある患者
本剤の減量を考慮するとともに、患者の状態を慎重に観察すること。本剤25mgを中等度の肝機能障害(Child-Pugh分類B)のある患者に単回投与した際、本剤のAUC(0-∞)及びCmaxが上昇した。本剤では重度の肝機能障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない。[16.6.3 参照]
- 9.4 生殖能を有する者
妊娠可能な女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。ラットにおいて、臨床最大用量投与時の非結合型曝露量(AUCu)の3.1倍の曝露量で着床後死亡の増加と生存胎児数減少が報告されている。[9.5 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。ラットにおいて、臨床最大用量投与時の非結合型曝露量(AUC_{0-∞})の1.2倍以上の曝露量で着床後死亡の増加、平均生存児数の減少、死産児の増加等が観察されている。また、臨床最大用量投与時の非結合型曝露量(AUC_{0-∞})の7.3倍の曝露量で眼球奇形の発生率の増加が報告されている。[2.2, 9.4 参照]

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。母動物(ラット)への投与で本剤は乳汁中へ移行することが報告されている。

9.7 小児等

本剤では小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

10. 相互作用

本剤はUGT1A1の基質である。[16.4 参照]

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
HIVプロテアーゼ阻害剤 アタザナビル、リトナビル、ロピナビル・リトナビル等 チロシンキナーゼ阻害剤 ソラフェニブ、エルロチニブ、ニロチニブ等 トラニラスト [16.7.1 参照]	本剤の作用が増強するおそれがあるため、併用する場合は、本剤の減量を考慮するとともに、患者の状態を慎重に観察すること。	本剤をアタザナビルと同時投与したところ、本剤のAUC(0-∞)及びC _{max} は上昇した。UGT1A1阻害により本剤のクリアランスが低下する。
多価陽イオン(カルシウム、鉄、マグネシウム、アルミニウム等)を含む経口製剤 [16.7.2-16.7.4 参照]	本剤の吸収が低下し、効果が減弱するおそれがあるため、併用する場合は、前後1時間以上間隔をあけて本剤を投与すること。	本剤を硫酸鉄と同時投与したところ、本剤のAUC(0-∞)及びC _{max} は低下した。本剤の消化管からの吸収が減少し、血中濃度が低下する。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 血栓塞栓症(0.3%)

脳梗塞(0.3%)、心筋梗塞(頻度不明)、シャント閉塞(頻度不明)等の血栓塞栓症があらわれることがある。[1. 参照]

11.1.2 間質性肺疾患(0.5%)

初期症状(呼吸困難、咳嗽、発熱等)が認められた場合には、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。間質性肺疾患が疑われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	1%以上	1%未満	頻度不明
代謝および栄養障害	鉄欠乏		
精神障害			不眠症
神経系障害		めまい(浮動性、回転性)	
眼障害		眼出血、糖尿病網膜症	結膜炎、眼瞼炎
心臓障害		心のう液貯留	
血管障害		高血圧	血圧低下
胃腸障害		便秘、下痢、悪心、嘔吐、腹痛	
皮膚および皮下組織障害		発疹、そう痒症	
一般・全身障害および投与部位の状態		浮腫	

13. 過量投与

13.1 症状

本剤の過量投与により、ヘモグロビン濃度が必要以上に上昇するおそれがある。

13.2 処置

本剤の減量・休薬等の適切な処置を行うこと。本剤は透析で除去されない。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意


PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

日本人健康男性被験者に本剤5、25、50、75、100、125又は150mgを食後に経口投与したときのモリデスタットの薬物動態パラメータは、下表のとおりである。また、投与量に比例した曝露量の増加が認められた。



投与量	n	AUC(0-∞) ($\mu\text{g}\cdot\text{h/L}$)	Cmax ($\mu\text{g/L}$)	tmax* (h)	t _{1/2} (h)
5mg	9	112 (11.6)	57.7 (28.5)	0.50 (0.50-1.50)	5.57 (24.0)
25mg	9	614 (19.4)	226 (28.0)	1.00 (0.50-2.50)	8.80 (38.5)
50mg	9	1230 (11.2)	511 (45.9)	0.50 (0.50-3.00)	9.46 (24.2)
75mg	9	1710 (23.0)	640 (32.5)	0.75 (0.50-1.50)	9.69 (35.8)
100mg	9	2510 (20.8)	988 (49.2)	2.00 (0.50-4.00)	7.05 (41.8)
125mg	9	3020 (21.7)	1100 (27.9)	1.50 (0.50-4.00)	9.41 (39.3)
150mg	9	3780 (17.6)	1220 (21.4)	2.00 (0.25-4.00)	8.75 (25.0)

幾何平均値(幾何CV%) ※中央値(最小値-最大値)

16.1.2 反復投与

日本人健康男性被験者に本剤5~150mgを食後に1日1回5日間反復投与したときのモリデスタットの薬物動態パラメータは、下表のとおりである。

投与量	n	AUC(0-24) _{ss} ($\mu\text{g}\cdot\text{h/L}$)	Cmax _{ss} ($\mu\text{g/L}$)	tmax _{ss} * (h)	t _{1/2,ss} (h)
5mg	9	120 (11.9)	55.6 (50.6)	0.50 (0.25-2.00)	6.25 (37.4)
25mg	9	657 (19.6)	319 (40.0)	1.00 (0.50-2.50)	6.20 (54.1)
50mg	9	1260 (16.0)	606 (31.4)	0.75 (0.50-2.50)	7.87 (66.0)
75mg	9	2030 (28.3)	698 (41.2)	2.00 (0.50-2.00)	6.52 (32.1)
100mg	9	2530 (21.5)	1008 (55.5)	1.50 (0.50-3.00)	7.45 (30.0)
125mg	9	3140 (22.1)	953 (29.5)	2.00 (0.50-2.50)	8.26 (42.4)
150mg	9	4030 (13.3)	1150 (14.0)	2.50 (2.00-3.00)	6.90 (25.8)

幾何平均値(幾何CV%) ※中央値(最小値-最大値)

16.2 吸収

16.2.1 絶対的バイオアベイラビリティ

健康男性被験者に本剤50mgを空腹時に経口投与したときの静脈内投与に対する絶対的バイオアベイラビリティは59%であった(外国人データ)。

16.2.2 食事の影響

日本人健康男性被験者に本剤50mgを空腹時又は食後に経口投与したとき、食後投与では空腹時投与と比べてAUC(0-∞)及びCmaxはそれぞれ23.3%及び41.1%低下し、tmaxは1時間遅延した。

16.3 分布

16.3.1 タンパク結合率

モリデスタット及びN-グルクロン酸抱合体のヒト血漿タンパク結合率はそれぞれ79.3%及び16.8%であり、モリデスタットの主な結合タンパクはアルブミンであった(*in vitro*)。

16.3.2 分布容積

健康男性被験者に本剤25mgを静脈内投与したときの分布容積(V_{ss})は46.9Lであった(外国人データ)。

16.4 代謝

本剤は主にUGT1A1によって、薬理的に不活性なN-グルクロン酸抱合体に代謝される(*in vitro*)。[10.参照]

健康男性被験者に[¹⁴C]モリデスタット25mgを液剤にて空腹時に経口投与したとき、血漿中のモリデスタットのAUC(0-t_{last})は総放射能の約18%、N-グルクロン酸抱合体のAUC(0-t_{last})は約82%であり、N-グルクロン酸抱合体は主要な代謝物であった(外国人データ)。

16.5 排泄

日本人健康男性被験者に本剤を食後に経口投与したとき、モリデスタットの消失半減期は約6~10時間であった。尿中には未変化体として投与量の約3~6%が排泄された。

健康男性被験者に本剤25mgを静脈内投与したときのクリアランスは28.7L/hであった(外国人データ)。

健康男性被験者に[¹⁴C]モリデスタット25mgを液剤にて経口投与したとき、投与した放射能の91%及び6.3%が尿中及び糞中に排泄され、尿中放射能の主成分はN-グルクロン酸抱合体(85.2%)であった(外国人データ)。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

健康被験者及び軽度から重度(透析患者含む)の腎機能障害患者[軽度：eGFR(mL/min/1.73m²)60~89、中等度：eGFR30~59、重度(非透析)患者：eGFR30未満、及び重度透析患者：eGFR30未満]に本剤20mgを空腹時に単回経口投与したとき、健康被験者と比較してモリデスタットのAUC(0-∞)はそれぞれ8%低下、6%、12%及び43%増加し、Cmaxはそれぞれ37%、10%、9%及び33%増加した(外国人データ)。

16.6.2 透析の影響

透析患者(血液透析患者、腹膜透析患者及び血液ろ過透析患者)に本剤75mgを透析施行日又は非透析施行日の空腹時に単回経口投与したとき、非透析日に対する透析日のモリデスタットのAUC(0-∞)はそれぞれ11%、5%及び2%低下、Cmaxはそれぞれ28%及び6%低下並びに17%増加であり、透析の影響はわずかであった(外国人データ)。

16.6.3 肝機能障害患者

軽度又は中等度肝機能障害患者(Child-Pugh分類A又はB)及び健康被験者に本剤25mgを空腹時に単回経口投与したとき、健康被験者と比較して軽度肝機能障害患者のモリデスタットのAUC(0-∞)及びCmaxはそれぞれ26%及び66%増加、中等度肝機能障害患者のモリデスタットのAUC(0-∞)及びCmaxはそれぞれ58%及び131%増加した(外国人データ)。[9.3.1 参照]

16.6.4 高齢者

非高齢(18~45歳)及び高齢(65~85歳)健康男女被験者に本剤20mgを空腹時に投与したとき、非高齢者と比較して高齢者のモリデスタットのAUC(0-∞)及びCmaxはそれぞれ33%及び39%増加した(外国人データ)。

16.7 薬物相互作用

16.7.1 アタザナビル

健康男性被験者にアタザナビル400mgを食後に反復投与した後、本剤25mgを食後に単回併用投与したときのモリデスタットの薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりである(外国人データ)。^[10.2 参照]

併用薬	併用薬投与量	本剤投与量	例数	幾何平均値の比[90%信頼区間] (アタザナビル併用投与時/本剤単独投与時)	
				Cmax	AUC(0-∞)
アタザナビル	400mg	25mg	13	2.07 [1.53, 2.79]	2.07 [1.87, 2.29]

16.7.2 経口鉄剤

健康男性被験者に硫酸鉄(Ⅱ)304mg(二価鉄として100mg)と本剤150mgを空腹時に単回併用投与したとき、硫酸鉄(Ⅱ)グリシン567.7mg(二価鉄として100mg、腸溶コーティング製剤)と本剤150mgを空腹時に単回併用投与したとき、及び本剤150mgを空腹時に投与する4又は2時間前、若しくは1時間後に硫酸鉄(Ⅱ)304mg(二価鉄として100mg)を単回併用投与したときのモリデスタットの薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりである(外国人データ)。

併用薬	併用薬投与量	本剤投与量	投与条件	例数	幾何平均値の比[90%信頼区間] (硫酸鉄又は硫酸グリシン併用投与時/本剤単独投与時)	
					Cmax	AUC(0-∞)
硫酸鉄	304mg	150mg	同時投与	14 ^{注)}	0.16 [0.12, 0.22]	0.25 [0.19, 0.33]
			硫酸鉄投与4時間後に本剤投与	14	0.90 [0.64, 1.26]	0.91 [0.77, 1.07]
			硫酸鉄投与2時間後に本剤投与	14	1.00 [0.71, 1.40]	0.84 [0.71, 0.99]
			硫酸鉄投与1時間前に本剤投与	14	0.88 [0.63, 1.23]	0.74 [0.63, 0.88]
硫酸鉄グリシン	567.7mg		同時投与	14	0.54 [0.39, 0.76]	0.50 [0.42, 0.60]

注) AUC(0-∞)は12例

また、健康男性被験者に硫酸鉄(Ⅱ)304mg(二価鉄として100mg)と本剤150mgを食後に単回併用投与したとき、及び本剤150mgを食後に投与する1時間前、若しくは1時間後に硫酸鉄(Ⅱ)304mg(二価鉄として100mg)を単回併用投与したときのモリデスタットの薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりである(外国人データ)。^[10.2 参照]

併用薬	併用薬投与量	本剤投与量	投与条件	例数	幾何平均値の比[90%信頼区間] (硫酸鉄併用投与時/本剤単独投与時)	
					Cmax	AUC(0-∞)
硫酸鉄	304mg	150mg	同時投与	11 ^{注1)}	0.39 [0.29, 0.51]	0.49 [0.42, 0.58]
			硫酸鉄投与1時間後に本剤投与	11	0.80 [0.60, 1.06]	0.80 [0.70, 0.93]
			硫酸鉄投与1時間前に本剤投与	11 ^{注2)}	0.60 [0.45, 0.80]	0.66 [0.57, 0.77]

注1) AUC(0-∞)は8例

注2) AUC(0-∞)は9例

16.7.3 酢酸カルシウム

健康男性被験者に酢酸カルシウム1900mgと本剤150mgを空腹時に単回併用投与したときのモリデスタットの薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりである(外国人データ)。^[10.2 参照]

併用薬	併用薬投与量	本剤投与量	例数	幾何平均値の比[90%信頼区間] (酢酸カルシウム併用投与時/本剤単独投与時)	
				Cmax	AUC(0-∞)
酢酸カルシウム	1900mg	150mg	15	0.53 [0.39, 0.72]	0.85 [0.67, 1.09]

16.7.4 酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム配合剤

健康男性被験者に酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム配合剤と本剤50mgを空腹時に単回併用投与したときのモリデスタットの薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりである(外国人データ)。^[10.2 参照]

併用薬	併用薬投与量	本剤投与量	例数	幾何平均値の比[90%信頼区間] (酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム配合剤併用投与時/本剤単独投与時)	
				Cmax	AUC(0-∞)
酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム配合剤	900mg・600mg	50mg	12	0.36 [0.26, 0.51]	0.67 [0.60, 0.75]

16.7.5 オメプラゾール

健康男性被験者にオメプラゾール40mgを空腹時に反復投与した後、本剤50mgを空腹時に単回併用投与したときのモリデスタットの薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりである(外国人データ)。

併用薬	併用薬投与量	本剤投与量	例数	幾何平均値の比[90%信頼区間] (オメプラゾール併用投与時/本剤単独投与時)	
				Cmax	AUC(0-∞)
オメプラゾール	40mg	50mg	12	0.96 [0.68, 1.35]	0.95 [0.85, 1.07]

16.7.6 ロスバスタチン

健康男性被験者にロスバスタチン5mgと本剤150mgを空腹時に単回併用投与したとき、及びロスバスタチン5mgを空腹時に単回投与し、その3時間後に本剤150mgを単回併用投与したときのロスバスタチンの薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりである(外国人データ)。

併用薬	併用薬投与量	本剤投与量	投与条件	例数	幾何平均値の比 [90%信頼区間] (ロスバスタチン 併用投与時/本剤 単独投与時)	
					Cmax	AUC(0-∞)
ロスバスタチン	5mg	150mg	同時投与	15 ^{注)}	1.30 [1.11、 1.52]	1.11 [0.96、 1.28]
			本剤投与 3時間前 にロスバ スタチン 投与	15 ^{注)}	0.98 [0.83、 1.14]	0.95 [0.82、 1.09]

注) AUC(0-∞)は14例


17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈保存期慢性腎臓病患者〉

17.1.1 国内第Ⅲ相試験[赤血球造血刺激因子製剤(ESA : erythropoiesis stimulating agents)未治療]

ESA未治療の腎性貧血を有する保存期慢性腎臓病患者162例を対象に、実薬対照としてダルベポエチン アルファを設定した非盲検比較試験を実施した(投与期間：52週間)。本剤は1日1回25mgで投与開始し、目標Hb値(11.0g/dL以上13.0g/dL未満)を維持するよう、5~200mgの範囲で適宜増減した。その結果、評価期間中(投与30~36週)の平均Hb値は下表のとおりであり、本剤のダルベポエチン アルファに対する非劣性が検証された。



	本剤群 (82例)	ダルベポエチン アルファ群(80例)
評価期間中(投与30~36週)の平均Hb値[両側95%信頼区間](g/dL) ^{※1}	11.28 ± 0.98 [11.07、11.50]	11.70 ± 0.90 [11.50、11.90]
ベースラインからの変化量(g/dL) ^{※2}	1.45 ± 1.08	1.70 ± 1.03
変化量の群間差[両側95%信頼区間](g/dL)	-0.38[-0.67、-0.08]	


※1：平均値±標準偏差

※2：調整済み平均値

また、評価期間中(投与30~36週)の平均Hb値が目標範囲内(11.0g/dL以上13.0g/dL未満)であった被験者の割合は、本剤群68.3%(56/82例)、ダルベポエチン アルファ群85.0%(68/80例)であった。本剤群での安全性評価対象例の副作用発現頻度は、19.5%(16/82例)であった。主な副作用は、鉄欠乏、間質性肺疾患各2.4%(2/82例)であった。

17.1.2 国内第Ⅲ相試験(ESAからの切替え)

腎性貧血を有する保存期慢性腎臓病患者164例を対象に、実薬対照としてダルベポエチン アルファを設定した非盲検比較試験を実施した(投与期間：52週間)。本剤は、切替え前のESA投与量に従い1日1回25mg又は50mgで投与開始し、目標Hb値(11.0g/dL以上13.0g/dL未満)を維持するよう、5~200mgの範囲で適宜増減した。その結果、評価期間中(投与30~36週)の平均Hb値は下表のとおりであり、本剤のダルベポエチン アルファに対する非劣性が検証された。



	本剤群 (82例)	ダルベポエチン アルファ群(82例)
評価期間中(投与30~36週)の平均Hb値[両側95%信頼区間](g/dL) ^{※1}	11.67 ± 0.83 [11.48、11.85]	11.53 ± 0.99 [11.31、11.74]
ベースラインからの変化量(g/dL) ^{※2}	0.35 ± 1.03	0.26 ± 1.00
変化量の群間差[両側95%信頼区間](g/dL)	0.13[-0.15、0.40]	

※1：平均値±標準偏差

※2：調整済み平均値


また、評価期間中(投与30~36週)の平均Hb値が目標範囲内(11.0g/dL以上13.0g/dL未満)であった被験者の割合は、本剤群80.5%(66/82例)、ダルベポエチン アルファ群82.9%(68/82例)であった。
本剤群での安全性評価対象例の副作用発現頻度は、7.3%(6/82例)であった。副作用は、鉄欠乏性貧血、糖尿病網膜症、血圧上昇、鉄欠乏、浮動性めまい、頭痛、そう痒症各1.2%(1/82例)であった。

〈血液透析患者〉

17.1.3 国内第Ⅲ相試験(ESA未治療)

ESA未治療の腎性貧血を有する血液透析患者25例を対象に非盲検試験を実施した(投与期間：24週間)。本剤は1日1回75mgで投与開始し、目標Hb値(10.0g/dL以上12.0g/dL未満)を維持するよう、5~200mgの範囲で適宜増減した。有効性評価対象例25例において、第8週までの最初の用量変更時におけるHb値のベースラインからの上昇速度は、-0.030g/dL/週であった。レスポンス割合*は、56.0%(14/25例)であった。

※：評価期間中(投与21~24週)の平均Hb値が目標Hb値内であること、評価期間中の50%以上のHb値が目標Hb値内にあること、評価期間の終了までに緊急治療(赤血球輸血又はESA投与)を受けていないことの3つの基準をすべて満たす被験者の割合




また、評価期間中(投与21~24週)の平均Hb値が目標範囲内(10.0g/dL以上12.0g/dL未満)であった被験者の割合は、60.0%(15/25例)であった。

安全性評価対象例25例で副作用はみられなかった。

17.1.4 国内第Ⅲ相試験(ESAからの切替え)

腎性貧血を有する血液透析患者229例を対象に、実薬対照としてダルベポエチン アルファを設定した二重盲検比較試験を実施した(投与期間：52週間)。本剤は1日1回75mgで投与開始し、目標Hb値(10.0g/dL以上12.0g/dL未満)を維持するよう、5~200mgの範囲で適宜増減した。その結果、評価期間中(投与33~36週)の平均Hb値は下表のとおりであり、本剤のダルベポエチン アルファに対する非劣性が検証された。



	本剤群 (153例)	ダルベポエチン アルファ群(76例)
評価期間中(投与33~36週)の平均Hb値[両側95%信頼区間](g/dL)*1	10.63 ± 1.34 [10.42, 10.84]	10.77 ± 0.78 [10.59, 10.95]
ベースラインからの変化量(g/dL)*2	-0.14 ± 1.43	-0.07 ± 1.00
変化量の群間差[両側95%信頼区間](g/dL)	-0.13[-0.46, 0.19]	

※1：平均値±標準偏差

※2：調整済み平均値


また、評価期間中(投与33~36週)の平均Hb値が目標範囲内(10.0g/dL以上12.0g/dL未満)であった被験者の割合は、本剤群65.4%(100/153例)、ダルベポエチン アルファ群78.9%(60/76例)であった。
本剤群での安全性評価対象例の副作用発現頻度は、5.2%(8/153例)であった。副作用は、心のう液貯留、緑内障、網膜出血、下痢、胃炎、心電図ST部分下降、ヘモグロビン減少、低カリウム血症、傾眠、薬疹各0.7%(1/153例)であった。

〈腹膜透析患者〉

17.1.5 国内第Ⅲ相試験

腎性貧血を有する腹膜透析患者51例を対象とした非盲検試験を実施した(投与期間：36週間)。本剤は1日1回75mgで投与開始し、目標Hb値(11.0g/dL以上13.0g/dL未満)を維持するよう、5~200mgの範囲で適宜増減した。有効性評価対象例51例(ESA未治療の患者2例、ESAからの切替え患者49例)において、レスポンス割合*は、54.9%(28/51例)であった。

※：評価期間中(投与30~36週)の平均Hb値が目標Hb値内であること、評価期間中の50%以上のHb値が目標Hb値内にあること、評価期間の終了までに緊急治療(赤血球輸血又はESA投与)を受けていないことの3つの基準をすべて満たす被験者の割合



また、評価期間中(投与30~36週)の平均Hb値が目標範囲内(11.0g/dL以上13.0g/dL未満)であった被験者の割合は、66.7%(34/51例)であった。安全性評価対象例の副作用発現頻度は、23.5%(12/51例)であった。主な副作用は、うっ血性心不全3.9%(2/51例)であった。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

モリデュスタットは、低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素(HIF-PH)を阻害することによって、通常酸素濃度下でHIFを安定化し、内因性エリスロポエチン(EPO)を誘導して赤血球産生を促進させる。

18.2 赤血球産生作用

モリデュスタットを正常ラット、イヌ及びサルに経口投与したとき、血漿中EPO濃度の上昇及び赤血球産生作用(ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値及び網状赤血球の増加)が認められた。また、モリデュスタットを腎性貧血ラットモデルに経口投与したとき、貧血の予防及び改善効果が認められた。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：モリデュスタットナトリウム
(Molidustat Sodium)


化学名：Monosodium 1-[6-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1H-pyrazol-5-olate

分子式：C₁₃H₁₃N₈NaO₂

分子量：336.28

性状：本品は白色～帯黄白色の粉末である。

化学構造式：



21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装

〈マスレッド錠5mg〉
100錠[10錠(PTP)×10]
〈マスレッド錠12.5mg〉
100錠[10錠(PTP)×10]

〈マスレッド錠25mg〉
100錠[10錠(PTP)×10]
〈マスレッド錠75mg〉
100錠[10錠(PTP)×10]

23. 主要文献

- 1) Besarab A, et al.: N Engl J Med. 1998; 339: 584-590
- 2) Singh AK, et al.: N Engl J Med. 2006; 355: 2085-2098
- 3) Pfeffer MA, et al.: N Engl J Med. 2009; 361: 2019-2032

24. 文献請求先及び問い合わせ先

文献請求先
バイエル薬品株式会社・メディカルインフォメーション
〒530-0001大阪市北区梅田二丁目4番9号
バイエル医療用医薬品のお問い合わせ先
電話0120-106-398

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田二丁目4番9号