

医療機関使用欄

トリキュラー®錠21、28
服用開始日

年 月 日

トリキュラー錠21、28に関するお問い合わせ【受付時間:365日24時間】

よいオーシー
OCサポートコール* 03-3267-4104

月～金10:00～16:00(土、日、祝日、年始年末を除く)

*OCサポートコールはバイエル薬品株式会社が一般社団法人日本家族計画協会に委託して運営しています。

バイエル薬品株式会社 くすり相談 トリキュラー専用ダイヤル 0120-554-177

月～金16:00～翌10:00(土、日、祝日、年始年末は24時間)

服用者携帯カード

経口避妊剤

トリキュラー®錠21、28を服用している方へ

- トリキュラー®錠21、28を服用すると、**血栓症(血管内に血のかたまりが詰まる病気)**を発現する可能性があります。
- 血栓症の早期発見のためにも**定期的な診察**を受けてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、**すぐに救急医療機関を受診**してください。

- 突然の足の痛み・腫れ
- 手足の脱力・まひ
- 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- 突然の視力障害(見えにくいところがある、視野が狭くなる) など

他の診療科、医療機関を受診する際には、
このカードを必ず提示してください。

服用者携帯カード

経口避妊剤

トリキュラー®錠21、28を服用している方へ

受診医療機関の先生方へ

- 次のような症状があらわれた場合は、血栓症の疑いがあります。症状が軽くても飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、頭痛、嘔吐(おうと)・吐き気 など

- 次のような状態になった場合、飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

体を動かさない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなります。適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

- この患者さんはトリキュラー®錠21、28（卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤）を服用しています。
- 患者さんが本カードの赤枠内に記載されている症状を訴えて受診した場合には、卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤に関連した**血栓症***の可能性を**念頭においた診察をお願いします。**

※主に下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症、まれに頭蓋内静脈洞血栓症、脳梗塞、腸間膜血栓症、網膜血栓症、心筋梗塞等

- 異常な症状があれば必要に応じて処方医にご相談ください。