

治療中は副作用が起こることも
あるので、体調の変化に
気をつけてください。

よくみられる副作用

- 手足症候群（手足の痛み、はれ）
- 発疹
- 高血圧（血圧の上昇）
- 下痢
- 発声障害（声がかすれる）
- 食欲減退
- 疲労

！ 手足症候群や高血圧は、投与開始 2ヵ月以内に起こりやすいとされていますので、その期間は特に、手足の変化や血圧の変動に注意し、担当医にその情報をお伝えください。

上記の症状が起こったら…

**受診時に
担当医・看護師・薬剤師へお知らせください。**

副作用が起こった状況、程度を「服用ダイアリー」手帳に記入しておきましょう。これらの症状の多くは、スチバーガ®錠を飲む量を一時的に減らしたり、休止したり、症状を抑えるお薬を使うことで和らげることができます。ただし、副作用の程度により早めに対処した方がいい場合もありますので、がまんせず、担当医・看護師・薬剤師に相談してください。

スチバーガを服用される患者さんへ

スチバーガ® 服用ダイアリー

弊社製品情報サイト(<http://pharma-navi.bayer.jp/stivarga/patient/>)をご参照ください



Bayer

資料請求先
バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
<http://byl.bayer.co.jp/>

2020年7月作成
PP-STI-JP-0541-29-06
資料番号 STI200901

(202007)STI-5.0 (II-HH)

