

医療機関使用欄

患者携帯カード

月経困難症治療薬

ヤーズ®配合錠を服用している方へ

- ヤーズ®配合錠を服用すると、**血栓症(血管内に血のかたまりが詰まる病気)**を発現する可能性があります。
- 血栓症の早期発見のためにも**定期的な診察**を受けてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、**すぐに救急医療機関を受診**してください。

- 突然の足の痛み・腫れ
- 手足の脱力・まひ
- 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- 突然の視力障害(見えにくいところがある、視野が狭くなる)など

ヤーズ®配合錠服用開始日

年 月 日

(202004)YAZ-3.0(10/オビ)(HH/HH)
PP-YAZ-JP-0090-18-03

ヤーズ®配合錠に関するお問い合わせ
バイエル薬品株式会社 くすり相談
ヤーズ専用ダイヤル:**0120-113-225**

受付時間:365日24時間

資材記号 YAZ200705

他の診療科、医療機関を受診する際には、
このカードを必ず提示してください。

ヤーズ[®]配合錠を服用している方へ

- 次のような症状があらわれた場合は、血栓症の疑いがあります。症状が軽くとも飲むのをやめて**すぐに医師に相談してください。**

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、頭痛、嘔吐(おうと)・吐き気 など

- 次のような状態になった場合、飲むのをやめて**すぐに医師に相談してください。**

体を動かせない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなり
ます。適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

受診医療機関の先生方へ

- この患者さんはヤーズ[®]配合錠(卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤)を服用しています。

- 患者さんが本カードの赤枠内に記載されている症状を訴えて受診した場合には、卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤に関連した**血栓症***の可能性を念頭においた診察をお願いします。

*主に下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症、まれに頭蓋内静脈洞血栓症、
脳梗塞、腸間膜血栓症、網膜血栓症、心筋梗塞等

- 異常な症状があれば必要に応じて処方医にご相談ください。