

トリキュラー錠28を初めてお飲みになる方へ

1 ウォレットパッケージを開けて、カレンダーシールをはがしてください。



2 トリキュラー錠28は、「**月経が始まった日**」から飲み始めます。

① 月経が始まった曜日が左端に印刷されているカレンダーシールをはがし、錠剤シート上に下の写真のように貼り付けてください。残りのカレンダーシールは捨ててください。




② カレンダーシールと錠剤の矢印にしたがって、赤褐色の錠剤から1日1錠ずつ28日間、毎日ほぼ一定の時刻に飲みます。通常、一番下の段の錠剤（やや大きい白色錠剤）を飲んでいる間に、月経に似た出血が起こります。




③ 出血が終わっていても続いていても、**28錠すべて飲み終わったら続けて新しい錠剤シートを飲み始めてください。**

④ トリキュラー錠28の服用を続ける場合、新しい錠剤シートの服用開始日は毎回同じ曜日になりますので、**①**と同じカレンダーシールを貼り付けてください。



トリキュラー錠21を初めてお飲みになる方へ

1 ウォレットパッケージを開けて、カレンダーシールをはがしてください。




2 トリキュラー錠21は、「**月経が始まった日**」から飲み始めます。

① 月経が始まった曜日が左端に印刷されているカレンダーシールをはがし、錠剤シート上に下の写真のように貼り付けてください。残りのカレンダーシールは捨ててください。




② カレンダーシールと錠剤の矢印にしたがって、赤褐色の錠剤から1日1錠ずつ21日間、毎日ほぼ一定の時刻に飲みます。全部飲み終わったら7日間休薬（薬を飲むのをやめる）します。最後の1錠を飲んだ後、通常休薬期間中に月経に似た出血が起こります。



③ 出血が終わっていても続いていても、**7日間の休薬が終わったら新しい錠剤シートを飲み始めてください。**

④ トリキュラー錠21の服用を続ける場合、新しい錠剤シートの服用開始日は毎回同じ曜日になりますので、**①**と同じカレンダーシールを貼り付けてください。



トリキュラー錠21/28服用中に注意していただきたいこと

● 飲み忘れたとき

【例】毎日21時(午後9時)に飲んでいるとき

● 1日飲み忘れて、次の日の服用時刻までに気づいたとき

服用 飲み忘れ 通常通りに服用 (時)

18 21 24 6 12 18 21 24 6 12 18 21 24 6 12 18

気づいた時点で、すぐに飲みわすれた1錠を服用

● 1日飲み忘れて、次の日の服用時刻に気づいたとき

服用 飲み忘れ 次の日 (時)

18 21 24 6 12 18 21 24 6 12 18 21 24 6 12 18

服用していない

昨日の分とあわせて2錠服用

● 2日以上連続して飲み忘れたとき

服用 飲み忘れ 飲み忘れ (時)

18 21 24 6 12 18 21 24 6 12 18 21 24 6 12 18

服用を中止し、他の避妊方法を使用。次の月経の初日から新しい錠剤シートで飲み始める。

※トリキュラー錠28の場合、やや大きい白色錠剤を飲み忘れたときは、飲み忘れた錠剤を飲んだものとみなし、飲み忘れた錠剤は飲まずに、気づいたときから通常通り飲みます。

● 服用を開始して1~2周期は、下記の症状が現れることがあります。

● 軽度の吐き気 ● 乳房の張り ● 周期の途中の軽度の出血

これらの症状は、いずれも通常は服用中に消失しますが、心配な場合や、その他にも身体に何か異常を感じたときは、医師または薬剤師に相談・報告してください。

● 次のような症状があらわれた場合には飲むのをやめてすぐに救急医療機関を受診してください。

● 手足 …… 足の突然の痛み・腫れ、脱力・まひ

● 胸 …… 突然の息切れ、押しつぶされるような痛み

● 頭 …… 激しい頭痛 ● 口 …… 舌のもつれ・しゃべりにくい

● 目 …… 突然の視力障害 など

● 次のような場合には、症状が軽くても飲むのをやめてただちに受診してください。

● 血栓症が疑われる症状があらわれた場合

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、頭痛、吐き気・嘔吐 など

● 体が動かせない状態になった場合、著しく血圧が上がった場合、脱水の状態になった場合など

● 以下のときは、医師に相談・報告してください。

● 一番下の段の錠剤（やや大きい白色錠剤）服用中に出血がこないとき（トリキュラー錠28の場合）

● 休薬期間中に出血がないとき（トリキュラー錠21の場合）

● 激しい下痢、または嘔吐が続くとき

● 他の薬や健康食品を服用・摂取するとき

● 臨床検査を受けるとき ● 妊娠を希望するとき

● その他、気になる症状があるとき

（トリキュラー錠21/28共通）

トリキュラー錠21/28専用アプリのご紹介

トリキュラー錠21/28の服用方法は理解されましたか？

忘れがちな服用時間のお知らせ、服用記録などアプリで簡単に管理することができますので、ぜひ専用アプリをダウンロードしてください。



つづけるミカタ ダウンロードはQRコードまたは「つづけるミカタ」で検索！

つづけるミカタ 検索

App Store Google play

お薬のパッケージのこの位置にあるコード番号を入力してください。

LOT/製造番号

この番号を入力

すべての機能のご利用には製品パッケージに印刷されているコード番号の入力が必要です。



服用開始日

月

日(曜日)

服用時間

:

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat

Memo

服用開始日

月

日(曜日)

服用時間

:

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat

Memo

服用開始日

月

日(曜日)

服用時間

:

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat

Memo

服用開始日

月

日(曜日)

服用時間

:

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat

Memo

服用開始日

月

日(曜日)

服用時間

:

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat

Memo

服用開始日

月

日(曜日)

服用時間

:

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat

Memo

トリキュラー錠21/28ダイアリー

記入方法と記入例

1. 服用開始日と服用時間を記入してください。

服用開始日 9月 8日(月曜日) 服用時間 21:00

2. カレンダーの月日を記入してください。

7

8 ○ 9 ○ 10 △ 11 × 12 ○ 13 ○

少し出血

15 × 16 ○ 17 ○ 18 19 ○ 20 ○

頭痛

9月 21 ○ 22 ○ 23 △ 24 ○

23:00

28

3. 服用状況を記入してください。

- 正しく服用した日…○印
- 服用時間が遅れた日…△印と何時に服用したかを記入。
- 服用を忘れてしまった日…×印

4. 発現したマイネートラブルを記入してください。

[ex.] 吐き気、頭痛、乳房の張り など

バイエル薬品株式会社

TRQ180701