

イグザレルトドライシロップ 小児用を服用される患者さんへ

大切な注意です。裏面も必ずお読みください。

イグザレルトは、血を固まりにくくして、血管の中で血が固まる病気（血栓塞栓症）を治療したり予防したりするお薬です。

年 月 日から		年 月 日まで	
体重	1回の服用量	1日の服用回数	
kg	mg mL	☐ 1日1回、24時間おきに服用	
計量・服用に 使用するピペット	mLのピペット	☐ 1日2回、12時間おきに服用	
		☐ 1日3回、8時間おきに服用	



取扱説明書および説明動画

イグザレルトドライシロップ小児用の調製方法および服用方法の詳細について、以下の二次元コードからアクセスし、「取扱説明書」および「説明動画」をご覧ください。



51.7mg
製剤は
こちら



103.4mg
製剤は
こちら



印刷した冊子での取扱説明書が必要な方は、
処方元の病院もしくは薬局にお問い合わせください。

必ず指示された服用方法に従って服用してください

バイエル薬品株式会社

イグザレルトドライシロップ小児用を服用される際には、以下の点にご注意ください

- ◆ イグザレルトについて十分にご理解いただくため、服用前に患者さん向けの冊子「イグザレルトを服用されるお子さまとそのご家族へ」をよくお読みください。
- ◆ 調製・服用・保管方法については、取扱説明書をよくお読みください。
- ◆ 歯の治療や手術を受ける場合には、イグザレルト服用中であることを、必ず事前に医師にお伝えください。
- ◆ 他の病院で治療を受ける場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、イグザレルト服用中であることを必ず医師、薬剤師にお伝えください。
- ◆ 飲み忘れると、血栓塞栓症が起こる危険性が高まります。必ず指示された1回の服用量、1日の服用回数を守ってください。
- ◆ 服用中は血が固まりにくくなるため、鼻や歯ぐきからの出血、皮下出血（あおあざ）が起こりやすくなります。これらの症状が出ても、ご自身やご家族の判断で服用をやめたり、飲む回数を減らしたりせず、主治医とご相談ください。
- ◆ 出血が気になる場合は、すぐに主治医にご連絡ください。
- ◆ 服用中は、ときに重大な出血（脳や内臓など見えない部位での出血）が起こるおそれもあります。以下に該当する場合は、すぐに主治医にご連絡ください。
 - ① ひどい頭痛がある
 - ② 血便（血液の色や黒い色の便）、血尿が出る
 - ③ 悪心（吐き気）がある、嘔吐する

病院名