

医疗机构使用栏

服用YAZ Flex®复方片剂的开始日期

年 月 日

YAZ Flex®复方片剂相关咨询
拜耳药品株式会社 药物咨询

YAZ Flex®专线

0120-822-091

受理时间：365天 24小时

患者随身卡

针对子宫内膜异位症的疼痛缓解剂、痛经治疗剂 **致正在服用YAZ Flex®复方片剂的人士**

- 服用YAZ Flex®复方片剂有可能出现**血栓形成**（一种血块堵塞在血管中的疾病）。
- 为尽早发现血栓形成，请**定期接受诊察**。
- 出现以下症状时，请**立即前往急救医疗机构就诊**。

- 突发性腿部疼痛、肿胀
- 手脚无力、麻木
- 突然呼吸急促、胸部有压迫性疼痛
- 剧烈头痛、口齿不清或说话困难
- 突发性视力障碍（例如，视力减退或视野变窄）等

前往其他诊疗科、医疗机构就诊时，
请务必出示此卡。

患者随身卡

针对子宫内膜异位症的
疼痛缓解剂、痛经治疗剂

致正在服用YAZ Flex®复方片剂的人士

- 出现以下症状时，应怀疑有发生血栓形成的可能性。即使症状轻微，也请停止服用并**立即咨询医师**。

腿部疼痛、肿胀、麻木、发红，潮热，头痛、呕吐、恶心等

- 如果出现以下状态，请停止服用并**立即咨询医师**。

无法活动身体、脱水等

如果长时间保持相同姿势或饮水不足容易引起血栓形成。请适度活动身体并及时摄取水分。

致受诊医疗机构的各位医师

- 该患者正在服用YAZ Flex®复方片剂（雌孕激素复方剂）。
- 当患者因出现本卡红框内所记载的症状而前来就诊时，请考虑与雌孕激素复方剂相关的**血栓形成*的可能性进行诊察**。
※主要是下肢静脉血栓形成、肺栓塞，较少情况是颅内静脉窦血栓、脑梗塞、肠系膜血管血栓形成、视网膜血栓形成、心肌梗塞等
- 如果出现异常症状，请根据需要咨询处方医师。