

醫療機構使用欄位

YAZ Flex®複方錠開始服用日

年 月 日

YAZ Flex®複方錠之相關諮詢  
拜耳藥品株式會社 藥物諮詢

YAZ Flex諮詢專線

**0120-822-091**

受理時間：365天 24小時

### 患者隨身卡

針對子宮內膜異位引起的  
疼痛緩解劑、痛經治療劑

致正在服用YAZ Flex®複方錠的人士

- 服用YAZ Flex®複方錠，可能出現**血栓**（因血塊引起的血管阻塞）。
- 請**定期接受醫師診察**，以便能早期發現血栓症。
- 若出現以下症狀，請**立即前往急救醫療機構就診**。

- 突發性腳部疼痛或腫脹
- 劇烈的頭痛、口齒不清或說話困難
- 手腳無力或麻木
- 突發性視力障礙（會有某些區域難以看見、視野變狹窄）等
- 突發性呼吸短促、胸悶疼痛感

前往任何醫療機構就診時，  
請務必出示本卡片。

## 患者隨身卡

針對子宮內膜異位引起的  
疼痛緩解劑、痛經治療劑

## 致正在服用 YAZ Flex® 複方錠的人士

- 出現以下症狀時，應懷疑有血栓形成。即使症狀輕微，也請停止服用並**立即向醫師諮詢**。

腳部疼痛、腫脹、麻痺、腿部發紅、潮熱，頭痛、嘔吐、噁心等

- 出現以下狀態時，請停止服用並**立即向醫師諮詢**。

身體無法自由動作、脫水等

長時間維持同樣姿勢，水分補充不足時，容易引起血栓形成。請適度地活動身體，並多加補充水分。

## 致醫療機構的醫師們

- 該患者正在服用YAZ Flex®複方錠（雌激素、黃體素複方劑）。
- 由於患者正服用雌激素、黃體素複方劑，當患者就診時若提到本卡片**紅框內記載之症狀**，則應懷疑是否為**血栓\***相關。
  - ※主要有下肢靜脈血栓、肺血栓性栓塞，較少情況是顱內靜脈竇血栓、腦梗塞、腸繫膜血栓、視網膜血栓、心肌梗塞等。
- 若出現異常症狀，請務必諮詢您的YAZ Flex®處方醫師。