

의료기관 사용란

YAZ Flex® 정 복용 개시일

년 월 일

YAZ Flex® 정에 관한 문의  
바이엘 야쿠힌사 제품상담  
YAZ Flex 전용 전화정보 서비스  
**0120-822-091**  
접수시간: 365일 24시간

PP-YZF-JP-0297-05-07

환자 휴대용카드

자궁내막증에 따른 통증개선제·  
월경곤란증 치료제

**YAZ Flex® 정**을 복용하시는 분께

- YAZ Flex® 정 복용시 **혈전색전증(피덩이에 의해 혈관이 막힘)**이 발생할 수 있습니다.
- **정기적인 진찰**은 혈전색전증 조기 예방에 도움이 될 수 있습니다.
- 다음과 같은 증상이 나타나면 **즉시 응급의료센터로 가십시오.**

- 갑작스러운 다리 통증·부기
- 심한 두통, 말하기 어려움(불분명한 발음)
- 쇠약·손, 다리의 마비
- 갑작스러운 시력장애(예, 시력이 안 좋거나 좁은 시야)
- 갑작스러운 숨참, 쥐어짜는 듯한 가슴통증

모든 진료 시 의사에게 이 카드를 보여주십시오.

## 환자 휴대용카드

자궁내막증에 따른 통증개선제·  
월경곤란증 치료제

**YAZ Flex® 정**을 복용하시는 분께

- 다음과 같은 증상이 나타난다면 혈전증이 의심됩니다. 증상이 가벼워 보이더라도 YAZ Flex® 복용을 중단하고 **즉시 의사와 의논하십시오.**

다리 통증·부기·저림·발적·홍조, 두통, 구역·구토 등

- 다음과 같은 증상이 나타나면 YAZ Flex® 복용을 중단하고 **즉시 의사와 의논하십시오.**

몸 움직임이 어려움, 탈수 등

장시간 같은 자세 유지하거나 수분 섭취가 부족할 경우 혈전증이 발생하기 쉽습니다. 물을 자주 마시고 적당한 운동을 하는 것이 권장됩니다.

## 의사 선생님들께

- 이 환자는 YAZ Flex® 정(에스트로겐·프로게스테론 복합제)을 복용하고 있습니다.
- 환자가 이 카드의 빨간 박스내에 기재되어 있는 증상을 호소하는 경우, 에스트로겐·프로게스테론 복합제로 인한 **혈전증\***의 가능성을 염두에 두고 **진찰해 주십시오.**  
※ 주로 하지정맥혈전증, 폐혈전색전증, 드물게 두개내 정맥동혈전증, 뇌경색증, 장간막혈관혈전증, 망막혈관혈전증, 심근경색증 등
- 이상 증상이 나타나면 필요시 YAZ Flex®를 처방한 의사와 연락하십시오.