

Para uso da instituição médica

Data de Início do Tratamento com YAZ Flex

A M D

PP-YZF-JP-0299-01-06

Dúvidas sobre o YAZ Flex
Help desk da Bayer Yakuhin Ltd.

Central de Atendimento do YAZ Flex: **0120-822-091**
(Somente em japonês)

24 horas por dia, 365 dias por ano

Cartão da paciente

Agente para melhora da dor associada à endometriose /
Agente terapêutico para dismenorrea

Às usuárias do YAZ Flex

- **Pode ocorrer tromboembolismo (obstrução dos vasos sanguíneos por coágulos de sangue)** ao tomar o YAZ Flex.
- **Manter consultas regulares** com seu médico pode ajudar a prevenir o tromboembolismo em um estágio inicial.
- Caso observe o desenvolvimento dos seguintes sintomas, **procure imediatamente um centro médico de emergência.**

- Dor repentina nas pernas/inchaço
- Fraqueza/paralisia nas mãos e pernas
- Falta de ar repentina e dor no peito com sensação de aperto
- Dor de cabeça intensa, dificuldade ao falar (ou fala enrolada)
- Comprometimento repentino da visão (por exemplo, pouca visão ou campo de visão estreito)

Apresente este cartão sempre que se consultar com qualquer médico.

- Deve haver suspeita de trombose quando surgirem os sintomas abaixo. Pare de tomar o YAZ Flex e agende **imediatamente uma consulta com um médico**, mesmo se os sintomas parecerem leves.

Dor • inchaço • dormência • vermelhidão • ondas de calor nas pernas ou dor de cabeça, vômitos, náuseas, etc.

- Quando surgirem as seguintes condições, pare de tomar o YAZ Flex e agende **imediatamente uma consulta com um médico**.

Dificuldade de movimentar o corpo, desidratação etc.

Ficar parada por um longo período ou reduzir a ingestão de água contribui para o início da trombose. Recomenda-se beber água com frequência e fazer exercícios físicos moderados

- Esta paciente está fazendo uso de YAZ Flex (preparação combinada de estrogênio e progesterona).
- **Deve haver suspeita de trombose* (devido ao tratamento combinado de estrogênio e progesterona)**, caso uma paciente relate quaisquer dos sintomas descritos anteriormente (vide o quadro vermelho neste cartão)
* Trombose venosa nas pernas e tromboembolismo pulmonar, principalmente. De forma não frequente, trombose venosa sinusal intracraniana, infarto cerebral, trombose venosa mesentérica, trombose vascular de retina, infarto do miocárdio etc.
- Se houver sintomas anormais, entre em contato com o médico que prescreveu o YAZ Flex, sempre que necessário.