

Для использования медицинскими учреждениями

Дата начала приема препарата YAZ Flex

год      месяц      число

PP-YZF-JP-0300-01-06

## Информационный запрос по препарату YAZ Flex

Справочная служба компании Bayer Yakuhin Ltd.

Колл-центр YAZ Flex: **0120-822-091**  
(только на японском языке)

Круглосуточно, без выходных

Карточка  
пациента

Препарат для уменьшения болевого синдрома, связанного с эндометриозом /  
Лекарственный препарат для уменьшения симптомов дисменореи

## Пользователям препарата YAZ Flex

- Во время приема YAZ Flex может развиваться **тромбоэмболия (окклюзия кровеносных сосудов сгустками крови)**.
- **Регулярное посещение врача** может помочь предотвратить развитие тромбоэмболических осложнений на ранней стадии.
- Если вы заметили развитие следующих симптомов, **немедленно обратитесь в центр оказания экстренной помощи.**

- Внезапная боль или отечность нижних конечностей
- Слабость / паралич верхних и нижних конечностей.
- Внезапная одышка и давящая боль в груди.
- Сильнейшая головная боль, затруднение речи (или невнятная речь).
- Внезапное ухудшение зрения (например, снижение остроты зрения или сужение полей зрения).

**Покажите эту карточку при посещении врача.**

**Пользователям препарата YAZ Flex**

- При появлении указанных далее симптомов следует заподозрить развитие тромбоза. Прекратите прием препарата YAZ Flex и **немедленно обратитесь к врачу**, даже если симптомы кажутся незначительными.

Боль, отечность, онемение, покраснение ноги и прилив жара в ноге, головная боль, рвота, тошнота, и т. п.

- При появлении следующих симптомов прекратите прием препарата YAZ Flex и **немедленно обратитесь к врачу**.

Трудности при движении тела, обезвоживание и т. д.

Длительная иммобилизация или недостаточное потребление воды могут являться факторами риска развития тромбоза. Рекомендуется чаще пить воду и практиковать умеренные физические нагрузки.

**Для врачей (специалистов здравоохранения)**

- Эта пациентка принимает препарат YAZ Flex (комбинированный эстроген-гестагенный препарат).
- **Стоит подозревать развитие тромбоза\*** (вследствие приёма комбинации эстроген-гестаген), если пациентка сообщает о каких-либо описанных ранее симптомах (см. красный квадрат на этой карточке).
- \* В основном тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. Иногда тромбоз внутричерепных венозных синусов, ишемический инсульт, тромбоз брыжеечных вен, тромбоз сосудов сетчатки, инфаркт миокарда и др.
- Если присутствуют необычные симптомы, при необходимости обратитесь к врачу, который выписал препарат YAZ Flex.