

Para uso del centro médico

Fecha de inicio del tratamiento con YAZ Flex

A

M

D

PP-YZF-JP-0301-01-06

Consultas sobre YAZ Flex

Centro de asistencia de Bayer Yakuhin Ltd.

Teléfono de atención
al cliente de YAZ Flex: **0120-822-091**
(Solo japonés)

24 horas al día, los 365 días

Tarjeta
de la paciente

Medicamento mejorado para el dolor asociado
a la endometriosis / Fármaco para la dismenorrea

Para las usuarias de YAZ Flex

- Puede producirse tromboembolismo (oclusión de un vaso sanguíneo por un coágulo de sangre) con el uso de YAZ Flex.
- Acudir con regularidad a la consulta del médico puede ayudar a prevenir el tromboembolismo en su fase inicial.
- Si nota la aparición de alguno de los siguientes síntomas, vaya a urgencias de inmediato.

- Dolor/hinchazón repentina en las piernas
- Debilidad/parálisis en manos y pies
- Dificultad para respirar y dolor opresivo en el pecho que aparecen de forma repentina
- Dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar (o mala pronunciación)
- Deterioro de la vista de forma repentina (p. ej., mala visión o campo visual reducido)

No olvide mostrar esta tarjeta cada vez que acuda al médico.

Tarjeta de la paciente

Medicamento mejorado para el dolor asociado
a la endometriosis / Fármaco para la dismenorrea
Para las usuarias de YAZ Flex

- Hay que sospechar de trombosis en caso de que aparezcan los siguientes síntomas. Deje de tomar YAZ Flex y pida cita con **el médico de inmediato**, aunque los síntomas parezcan leves.

Dolor, hinchazón, entumecimiento, enrojecimiento y calor en las piernas o dolor de cabeza, vómitos, náuseas, etc.

- Si se desarrolla el siguiente cuadro clínico, deje de tomar YAZ Flex y pida cita con **el médico de inmediato**.

Dificultad para mover el cuerpo, deshidratación, etc.

Estar inactiva durante mucho rato o beber poca agua puede contribuir a la aparición de trombosis. Se recomienda beber agua con frecuencia y realizar un ejercicio moderado

Para el médico o especialista

- La paciente está tomando YAZ Flex (combinación de estrógenos y progesterona).
- **Se debe sospechar trombosis*** (debido al tratamiento combinado a base de estrógenos y progesterona), si la paciente presenta alguno de los síntomas descritos anteriormente (véase el recuadro rojo de esta tarjeta)
*Trombosis venosa en las piernas y tromboembolismo pulmonar, principalmente. Con menor frecuencia: trombosis venosa sinusal intracraneal, infarto cerebral, trombosis venosa mesentérica, trombosis vascular retiniana, infarto de miocardio, etc.
- En caso de síntomas extraños y siempre que sea necesario, póngase en contacto con el médico que le ha recetado YAZ Flex.