

Para uso en institución médica

Fecha de inicio del tratamiento con YAZ Flex

A

M

D

PP-YZF-JP-0302-01-06

Preguntas sobre YAZ Flex

Servicio de atención telefónica de Bayer Yakuhin Ltd.

Centro de atención
telefónica de YAZ Flex: **0120-822-091**
(Solo en japonés)

24 horas al día, los 365 días del año

Tarjeta
de tratamiento
del paciente

Medicamento que alivia el dolor asociado a la endometriosis /
Producto terapéutico para la dismenorrea

Para usuarios de YAZ Flex

- Cuando usted toma YAZ Flex podría producirse **tromboembolia (oclusión de vasos sanguíneos por coágulos de sangre)**.
- **Hacer visitas regulares** a su médico puede ayudar a prevenir la tromboembolia en una fase temprana.
- Si observa el desarrollo de los siguientes síntomas, **acuda inmediatamente a un centro médico con servicio de urgencias**.

- Dolor de aparición repentina en la pierna/hinchazón
- Debilidad/parálisis de la mano y la pierna
- Dificultad respiratoria repentina y dolor torácico opresivo
- Dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar (o habla arrastrada)
- Deficiencia visual repentina (por ejemplo, mala visión o disminución del campo visual)

Por favor, muestre esta tarjeta de tratamiento cada vez que visite a un médico.

- Se debe sospechar trombosis cuando aparecen los siguientes síntomas. Deje de tomar YAZ Flex y solicite una consulta con un **médico de inmediato**, incluso si los síntomas parecen ser leves.

Dolor, hinchazón, entumecimiento, enrojecimiento, calor en la pierna o cefalea, vómitos, náuseas, etc.

- Cuando se presenten los siguientes condiciones, deje de tomar YAZ Flex y solicite una consulta con un **médico de inmediato**.

Dificultad para mover el cuerpo, deshidratación, etc.

Permanecer quieto durante mucho tiempo o una menor ingesta de agua contribuye a la aparición de trombosis. Se recomienda beber agua con frecuencia y practicar ejercicio moderado

- Este paciente está tomando YAZ Flex (preparación con una combinación de estrógeno y progesterona).
- **Se debe sospechar trombosis*** (debido al tratamiento combinado de estrógeno y progesterona), si un paciente refiere alguno de los síntomas descritos anteriormente (véase el recuadro marcado en rojo en esta tarjeta)
*Flebotrombosis de la pierna y tromboembolia pulmonar, principalmente. Trombosis del seno venoso intracraneal poco frecuente, infarto cerebral, trombosis de vasos mesentéricos, trombosis vascular retiniana, infarto de miocardio, etc.
- Si se presentan síntomas anómalos, póngase en contacto con el médico que le recetó YAZ Flex siempre que sea necesario.